



ÉRUPTIONS CUTANÉES INFECTIEUSES

PRESCRIPTIONS

ACNÉE

- ERYTHROMYCINE 4 g + TRETINOINE 0.025 g (gel en application cutanée) - 1 application le soir 🖋 Si irritation primaire passer à une application un jour sur deux pendant 3 mois, puis réévaluation
- GLUCONATE DE ZINC 104.55 mg gélule - 2 gélules en une seule prise pendant mois

IMPÉTIGO

- DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE + CHLORURE DE BENZALKONIUM (solution pour application locale) - 2 applications locales par jour
- MUPIROCINE 2 % pommade - 1 à 3 applications par jour pendant 5 jours

⚠ l'acide fusidique est sortie des recommandations

CHÉILITE ANGULAIRE (PERLECHE)

- MUPIROCINE 2 % pommade - 1 à 3 applications par jour pendant 5 jours

💡 En association alternée avec

- NITRATE D'ÉCONAZOLE 1 g (crème ou émulsion fluide) - 2 applications par jour (crème sur les commissures labiales, émulsion fluide sur les lèvres).

ABCÈS, PANARIS, PLAIES INFECTÉES

- DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE + CHLORURE DE BENZALKONIUM (solution pour application locale) - 2 applications locales par jour
- MUPIROCINE 2 % pommade - 1 à 3 applications par jour pendant 5 jours

💡 L'indication d'antibiotiques dans le panaris n'est pas consensuelle : si vous optez pour un traitement antibiotique, il doit être à visée anti-staphylococcique :

- PRISTINAMYCINE PO : 1 g 2 à 3 fois/j pendant 7 jours ou CLOXACILLINE PO : 50 mg/kg/j (sans dépasser 4 g/j) en 3 prises quotidiennes pendant 7 jours ou AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE PO : 1 g 3 fois/j pendant 7 jours

⚠ **A réévaluer systématiquement à 48h : indication chirurgicale si évolution défavorable.**

🚑 **N'hésitez pas à envoyer le patient aux urgences en cas de morsures / plaies au niveau des mains (liste SOS mains disponible sur la plateforme)** 🚑

ÉRYSIPELE

- AMOXICILLINE TRIHYDRATÉE 1 g PO - 50 mg/kg/jour en 3 prises par jour (max 6g/j) pendant 7 jours.

👉 Si allergie : PRISTINAMYCINE à 8000 UI/mg PO 2 comprimés le matin le midi et le soir pendant 7 jours

MEDADOM



 Score de Quick Sofa

Fréquence respiratoire > 21 respirations/minutes

PAS < 100 mmHg

Altération neurologique

 Prise de médicaments

Prise d'un médicament ou d'un toxique imputable à l'éruption ?

 Signes de gravité

Fièvre

Pétéchies, purpura

Choc septique ou toxinique

Signes méningés associés

Rapidité de l'installation de l'éruption < 20 minutes

**Rédaction par le Dr MIALHE Bernard,
Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr JOUVE Antoine, ANDRE Elies et
MAILLET Florent.**

MEDADOM 
se connecter. se soigner.

Une question ?

**Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante affaires-
medicales@medadom.com.**

**Edité le 04/03/2024 par MEDADOM -
Tous droits réservés à Synapse SAS®**