

MÉNINGITE INFECTIEUSE

PRESCRIPTIONS

☞ L'administration d'une antibiothérapie préhospitalière est recommandée en cas de purpura fulminans, **quel que soit l'état hémodynamique du patient.**

ANTIBIOTHÉRAPIE PRÉHOSPITALIÈRE

- **CEFTRIAXONE** : 1 à 2g en injection IM ou IV ou
- **CEFOTAXIME** : 1g en injection IM ou IV.

CONSEILS

⚠ entre la ceftriaxone intraveineuse, et intramusculaire. Pour la préparation IM, le solvant de la **ceftriaxone contient de la xylocaïne 1% (sans adrénaline)** pour réduire la douleur ⚠ : cette préparation avec xylocaïne est réservée **exclusivement** à l'administration IM et ne doit **jamais** être administrée par voie IV.

Si un-e infirmier-e est disponible, l'administration peut être réalisée en téléconsultation. Sinon, contactez immédiatement le SAMU (15) pour une prise en charge urgente ☞ l'antibiothérapie ne doit jamais retarder le transfert vers l'hôpital.

RECOMMANDATIONS DU COMITE MEDICAL

📋 SIGNES CLEFS

- 🤯 Confusion mentale / hallucinations **primordiale à repérer,**
- 🤢 Vomissements,
- 🤒 Fièvre élevée,
- 🩸 Raideur de nuque,
- 🤯 Céphalées intenses,
- 📡 Photophobie
- 🧠 Troubles neurologiques et,
- ⚠️ 🩸 Purpuras fulminans et/ou sepsis sévère = **urgence**

🔴 A FAIRE EN TELECONSULTATION

- **Information au patient et entourage :** **expliquez la gravité de la situation +++**
- **Transfert en urgence :** le patient doit être transporté dans une unité de soins intensifs par une équipe médicalisée (SAMU). Informez le service d'accueil de l'état du patient comme « Cas suspect de purpura fulminans » et rédiger une lettre d'adressage aux urgences qui sera remis au patient.

Rédaction par le Dr ANDRE Elies,

Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr JOUVE Antoine, FEVRE Chloé et MAILLET Florent.

MEDADOM

Une question ?

Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante affaires-medicales@medadom.com.