



MYCOSES, DERMATOPHYTOSES ET GALE

PRESCRIPTIONS

CANDIDOSE OROPHARYNGÉE

Proposer un prélèvement afin de conditionner la prise en charge après l'anti-fongique probabiliste.

- MICONAZOLE 2 % : gel buccal - tube de 80 g (25 cuillères-mesure de 2,5 ml) - 4x/ jour après chaque repas pendant 7 à 10 jours

⚠ Ne pas manger ou boire juste avant et après la prise du gel ⚠ Laisser agir 1 minute avant de déglutir

Si candidose plus importante,

- AMPHOTERICINE B 10 g/100 ml (suspension buvable) - 1 cuillère à café matin midi et soir pendant 21 jours ⚠ **A adapter à la fonction rénale** ou FLUCONAZOLE 100 mg PO - 2 gélules le premier jour puis 1 gélule par jour pendant 21 jours ⚠ **A adapter à la fonction rénale**

CANDIDOSE CUTANÉE (INTERTRIGO, DERMATOPHYTOSES)

Si zone peu étendue :

- ECONAZOLE NITRATE 1 % (crème) - 1 application par jour le soir après la toilette pendant 21 jours

Si lésions extensives multiples (>3) :

- ECONAZOLE NITRATE 1 % (crème) - 1 application par jour le soir après la toilette pendant 21 jours
- et TERBIAFINE 250 mg comprimé - 1 cp par jour pendant 3 mois

Si forme réfractaire aux précédents traitement (prélèvements mycologique recommandés éviction des facteurs favorisants, remise en

cause du diagnostic) :

- Discuter BETHAMETHASONE DIPROPIONATE 0,05 % (crème) - 1 application par jour pendant 7 jours
- et ECONAZOLE NITRATE 1 % (crème) - 1 application par jour le soir après la toilette pendant 7 jours

ONYCHOMYCOSE (prélèvements mycologique recommandés)

Si atteinte des 2/3 distaux :

- CHLORHYDRATE D'AMOROLFINE 5 g 1 application 2 fois par semaine pendant 3 mois (main) 6 mois (pied)

Si atteinte proximale :

- CHLORHYDRATE D'AMOROLFINE 5 g (vernis ongles méd) 1 application 2 fois par semaine pendant 3 mois (main) 6 mois (pied)
- et TERBITAFINE CHLORHYDRATE 250 mg - 1 comprimé par jour pendant 6 semaines (main), 3 mois (pied)

TEIGNE

- GRISEOFULVINE 500 mg PO - 1 comprimé au repas de midi et du soir pendant 8 semaines

GALE

- BENZOATE DE BENZYLE 10 g (émulsion cutanée) - 1 application après une douche en 2 couches successives à 10 minutes d'intervalle, à renouveler au bout de 8 jours

👤👤 **Adulte et enfant de plus de 2 ans :** 2 applications à 8 jours d'intervalle. Prendre un bain ou une douche le soir avant le traitement et se sécher soigneusement, en utilisant du linge propre (vêtements, serviette de bain) pour éviter une nouvelle contamination.

A l'aide d'une compresse, appliquer l'émulsion en 2 couches successives espacées de 10 à 15 minutes (le temps de laisser sécher l'émulsion) sur tout le corps, sauf sur le visage, en insistant sur les mains et dans les plis de la peau et sous les ongles. Laisser agir pendant 24 heures, puis se laver et rincer abondamment pour éliminer le produit. Il est de nouveau nécessaire de prendre une serviette de bain et des vêtements propres. Les draps doivent également être changés deux fois : juste avant l'application du produit et juste après le rinçage. Une seconde application doit être faite selon les mêmes modalités 8 jours plus tard.

👩 Femme enceinte : même schéma que pour l'adulte, on appliquera seulement 1 seule couche.

- IVERMECTINE 3 mg PO - 200 mcg par kg de poids en une seule prise unique. Renouveler au bout de 2 semaines si apparition de nouvelle lésions

🧼 Règles hygiéno-diététiques

1 - Laver le linge qui le supporte à une température supérieure à 60°C (draps, alèses, taies, serviettes de toilette, linges de corps...).

2 - Si le linge ne supporte pas le lavage >60°C (linge fragile, articles non lavables...), 2 possibilités au choix :

🦋 Produit acaricide : type " A-PAR* " pour le linge non lavable à 60°C et pour l'environnement (acheté en pharmacie), à utiliser loin de toute flamme et dans une pièce aérée.

*Attention les produits acaricides ne doivent pas être manipulés par ou en présence d'une personne asthmatique.

🧺 Si l'utilisation d'un produit acaricide n'est pas envisageable, le linge peut être mis en quarantaine dans un sac hermétique. Le temps de quarantaine dépend du type de gale.

💡 Pour une **gale commune** : **3 jours de quarantaine minimum** et pour une **gale profuse** : **8 jours de quarantaine**.

POSOLOGIE DU STROMECTOL® EN FONCTION DU POIDS (SOURCE VIDAL)

Poids corporel (kg)	Dose en nombre de cp à 3 mg
15 à 24 kg	1 cp
25 à 35 kg	2 cp
36 à 50 kg	3 cp
51 à 65 kg	4 cp
66 à 79 kg	5 cp
> 80 kg	6 cp

Rédaction par le Dr MIALHE Bernard,
Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr JOUVE Antoine, ANDRE Elies et
MAILLET Florent.

MEDADOM 
se connecter. se soigner.

Une question ?
Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante affaires-medicales@medadom.com.

Edité le 01/08/2024 par MEDADOM -
Tous droits réservés à Synapse SAS®