

MYCOSES, DERMATOPHYTOSES ET GALE 1/2

PRESCRIPTIONS

CANDIDOSE OROPHARYNGÉE

Proposer un prélèvement afin de conditionner la prise en charge après l'anti-fongique probabiliste.

- MICONAZOLE 2 % : gel buccal - 2,5mL : 4x/ jour après chaque repas pendant 7 à 14 jours.

/!\ Ne pas manger ou boire juste avant et après la prise du gel.

/!\ Laisser agir 1 minute avant de déglutir.

Si candidose plus importante,

- AMPHOTERICINE B 10% (suspension buvable) : 15mL x 3-4/j pendant 10 à 14j. /!\ **À adapter à la fonction rénale** ou,
- FLUCONAZOLE 100 mg PO : 2 gélules le premier jour puis 1 gélule par jour pendant 21 jours /!\ **À adapter à la fonction rénale.**

CANDIDOSE CUTANÉE (INTERTRIGO, DERMATOPHYTOSES)

Si zone peu étendue :

- ECONAZOLE NITRATE 1 % (crème) - 1 application par jour le soir après la toilette pendant 21 jours.

Si lésions extensives multiples (>3) :

+ TERBINAFINE 250 mg comprimé - 1 cp par jour pendant 3 mois.

ONYCHOMYCOSE (prélèvements mycologique recommandés)

Si atteinte des 2/3 distaux :

- AMOROLFINE 5% 1 application 2 fois par semaine pendant 3 mois (main) 6 mois (pied).

Si atteinte proximale :

- CHLORHYDRATE D'AMOROLFINE 5 g (vernis ongles méd) 1 application 2 fois par semaine pendant 3 mois (main) 6 mois (pied),
- et TERBINAFINE CHLORHYDRATE 250 mg - 1 comprimé par jour pendant 6 semaines (main), 3 mois (pied).

TEIGNE

- TERBINAFINE 250mg PO - 1 cp/j pendant 28 jours
- Réévaluation clinique à 4 semaines avec résultats mycologiques.



GALE

- IVERMECTINE 3 mg PO - 200 µg/kg en 1 prise unique avec rappel à J8, à prendre au moins 2h avant ou après la prise de nourriture sauf les enfants.

/!\ Femme enceinte : privilégier la PERMETHRINE pendant la grossesse, allaitement, poids <15kg.

Appliquer le tube entier sur toute la peau (sauf visage). Laisser agir pendant 8 à 14h. Puis rincer à l'eau et au savon. Renouveler le traitement à J8.

/!\ Règles hygiéno-diététiques

1 - Laver le linge qui le supporte à une température supérieure à 60°C (draps, alèses, taies, serviettes de toilette, linges de corps...),

2 - Si le linge ne supporte pas le lavage 60°C (linge fragile, articles non lavables...), 2 possibilités au choix :

- Produit acaricide : type " A-PAR* " pour le linge non lavable à 60°C et pour l'environnement (acheté en pharmacie), à utiliser loin de toute flamme et dans une pièce aérée.

*Attention les produits acaricides ne doivent pas être manipulés par ou en présence d'une personne asthmatique.

- Si l'utilisation d'un produit acaricide n'est pas envisageable, le linge peut être mis en quarantaine dans un sac hermétique. Le temps de quarantaine dépend du type de gale.

/!\ Pour une **gale commune** : **3 jours de quarantaine minimum** et pour une **gale profuse** : **8 jours de quarantaine.**



MYCOSES, DERMATOPHYTOSES ET GALE 2/2

POSOLOGIE DU STROMEKTOL® EN FONCTION DU POIDS (SOURCE VIDAL)

Poids corporel (kg)	Dose en nombre de cp à 3 mg
15 à 24 kg	1 cp
25 à 35 kg	2 cp
36 à 50 kg	3 cp
51 à 65 kg	4 cp
66 à 79 kg	5 cp
> 80 kg	6 cp



Points de vigilance :

- Réévaluer en cas d'absence d'amélioration après la durée attendue du traitement,
- Respect des précautions d'hygiène et de prévention de la transmission.

Nos
sources



Rédaction par le Dr BOUDOUL Blandine, relu par le Dr COSTA Mathilde et
validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr FEVRE Chloé, Dr BENICHO Simon, Dr ANDRE Elies et Dr MAILLET Florent.

MEDADOM 
se connecter se soigner

Une question ?

Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante affaires-medicales@medadom.com.