

OTITE 1/2

OTOSCOPIE

EN CAS DE TELECONSULTATION VIA L'APPLICATION :

- Annuler la téléconsultation et orienter le patient vers une borne en pharmacie.

EN CAS DE TELECONSULTATION VIA UNE BORNE/CABINE :

- Utiliser systématiquement l'otoscope connecté,
- Ne jamais refuser une otoscopie,
- En cas de dysfonctionnement, si le tympan n'est pas visible ou le moindre doute, orienter le patient vers une consultation en présentiel.

Antibiothérapie requise	Antibiothérapie non-requise
Tympan uniquement congestif ou Tympan encombré ou observation impossible et signes indirects qui ne requièrent pas une antibiothérapie.	Tympan uniquement congestif ou Tympan encombré ou observation impossible et signes indirects qui ne requièrent pas une antibiothérapie.

PRESCRIPTIONS

OTITE MOYENNE AIGUE

1ERE INTENTION SI SYMPTOMATOLOGIE BRUYANTE

Antibiothérapie (durée de 5 jours) :

- AMOXICILLINE PO,

Enfant > 3 ans : 80 mg/kg/j en 2 prises (max 3g/j),

Adulte : 3 g/j en 2 à 3 x/j.

Si allergie à la pénicilline (sans CI aux céphalosporines) :

- CEFPODOXIME-PROXÉTIL per os,

Enfant > 3 ans : 8 mg/kg/j en 2 prises (max 400mg/j),

Adulte : 200mg 2x/j,

ou (adulte uniquement) : CÉFUROXIME-AXÉTIL PO : 250 mg 2x/j.

Si contre-indication aux bêta-lactamines :

- COTRIMOXAZOLE per os,

Enfant > 3 ans : SMX 30mg/kg/j + TMP 6mg/kg/j en 2 prises (max 800mg/160 mg/j),

Adulte : 800 mg/160 mg 2x/j (**contre-indiqué avant 10 semaines d'aménorrhée et allaitement impossible si déficit en G6PD du nourrisson**) ou (adulte uniquement) : PRISTINAMYCINE PO : 1 g 2x/j (**compatible en cas de grossesse/allaitement**).

/!\ En cas d'échec à 72h: avis spécialisé en présentiel.

SUSPICION D'HAEMOPHILUS

Syndrome otite-conjonctivite : oriente vers H.influenzae,

- AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE PO : 80mg/kg/j en 3 prises par jour pendant 5 jours (en dose exprimée en amoxicilline sans dépasser 3g/24h).

Otorrhée ou otite récidivante (=récidive des symptômes plus de 4 jours après l'arrêt des traitements antibiotiques),
→ Dans le cadre des TLC, orienter le patient vers un ORL.

Si l'enfant est peu symptomatique : abstention d'antibiothérapie possible avec réévaluation clinique à 48-72h à mentionner dans votre compte-rendu.

OTITE EXTERNE CHEZ L'ADULTE

- OFLOXACINE 1.5 mg 1 dose (soit 10 gouttes) le matin et le soir qsp 7 jours.

Technique d'instillation des gouttes antibiotiques auriculaires :

En position couché, l'oreille atteinte doit être en position haute : instiller la dose prescrite, attendre allongé pendant 3 à 5 min, ne pas occlure l'oreille.



FAQ

1 Où puis-je me former aux outils connectés ?

Via nos **formations** dispositifs médicaux **tous les lundis de 12h à 12h30.**




Via nos **tutoriels** disponibles sur MEDADOM.



2 Où puis-je trouver un dispositif de TLC ?

Via notre **carte de France** disponible sur notre site internet MEDADOM.



Points de vigilance :

- Tympan non visible,
- Hyperalgie (cris, hurlements, insomnies, EN=7-10...),
- Fièvre persistante >40°C,
- Vomissements incoercibles,
- Perte de l'audition persistante,
- Paralysie faciale homolatérale.

Nos sources



Rédaction par le Dr BOUDOUL Blandine, relu par le Dr COSTA Mathilde et validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr FEVRE Chloé, Dr BENICHOU Simon, Dr ANDRE Elies et Dr MAILLET Florent.

MEDADOM 

Une question ?

Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante affaires-medicales@medadom.com.