



MORSURES DE TIQUES

PRESCRIPTIONS

PRISE EN CHARGE IMMEDIATE

Retrait de la tique :

- Utiliser une pince fine, saisir la tique au plus près de la peau, tirer doucement sans écraser,
- Nettoyer la zone avec un antiseptique.

Antibioprophylaxie :

- ⚠ Pas systématique,
- Indiquée en cas de tique attachée > 36-48h, dans une zone d'endémie, si le traitement peut débuter dans les 72h après le retrait,
- Traitement possible : DOXYCYCLINE 200 mg en dose unique orale.

TRAITEMENT DE L'ADULTE 🧑🧑

1ÈRE INTENTION : DOXYCYCLINE PO : 100 mg 2 fois/j qsp

- 10j si erytème migrant isolé,
- 14j si erytème migrant multiple,
- 21j si lymphocytome borrélien.

2ÈME INTENTION : AMOXCILLINE : 1gr 3x/j qsp

- 10j si erytème migrant isolé,
- 14j si erytème migrant multiple,
- 21j si lymphocytome borrélien.

TRAITEMENT DE L'ENFANT 🧒🧒

1ÈRE INTENTION : DOXYCYCLINE PO : 100 mg 2 fois/j qsp

- 10j si erytème migrant isolé,
- 14j si erytème migrant multiple,
- 21j si lymphocytome borrélien.

2ÈME INTENTION : AMOXCILLINE : 1gr 3x/j qsp

- 10j si erytème migrant isolé,
- 14j si erytème migrant multiple,
- 21j si lymphocytome borrélien.

VIGILANCE



AEG +/- fièvre et céphalées intenses,

Palpitations / malaise / douleur thoracique,
Troubles visuels / auditifs,

Raideur de nuque, paralysie faciale, myalgies /
arthralgies diffuses, douleur radiculaire /
paresthésies,

Érythèmes multiples, suppuration ou nécrose locale.

Rédaction par le Dr COSTA Mathilde,

Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr FEVRE Chloé, Dr BENICHOU Simon, ANDRE Elies et MAILLET Florent.